

# CONTRIBUTION A LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE LA HAUTE-MARNE COLÉOPTÈRES

par R. PESCHET.

J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1) a déjà publié un grand nombre de renseignements sur la répartition des Coléoptères dans le département de la Haute-Marne, renseignements dus en majeure partie aux chasses qu'il y a faites lors de ses séjours à Saint-Dizier et à Gudmont.

D'autre part, une série d'espèces haut-marnaises se trouvent citées dans la « Faune des Coléoptères du Bassin de la Seine », notamment dans les volumes relatifs aux *Staphylinoidea* (J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, II (1907), fasc. 1) et aux *Scarabaeidae* (L. BEDEL, IV (1911), fasc. 1).

J'ai recueilli moi-même en Haute-Marne un certain nombre d'espèces à noter : la plupart sont déjà connues du bassin de la Seine, mais y paraissent très localisées et à l'extrême limite de leur aire de dispersion.

\* \* \*

*Cicindela germanica* ab. *caerulea* Herbst. — Le type est commun en août et septembre aux environs d'Eurville, ainsi qu'à Chaumont; la variété bleue y est au contraire fort rare.

*Carabus arvensis* L. — Forêt du Val, lisière voisine d'Eurville, sous la mousse au pied des arbres, en septembre, trois individus appartenant au type à pattes noires. La variété à cuisses rouges (*pomeranus* Ol.) avait seule été signalée jusqu'à ce jour (*Bull. Soc. Sc. nat. de la Haute-Marne*, sep. p. 3).

*Elaphrus uliginosus* F. — Eurville, un individu, au bord de la Marne. Espèce rare dans le bassin de la Seine.

*Licinus depressus* Payk. — Eurville, trois individus dans les détritits d'inondations de la Marne, en mars 1910.

*Licinus granulatus* Dej. et *L. cassideus* F. — Tous deux assez

(1) Contributions à la faune française, 1<sup>re</sup> partie in *L'Abeille*, XXX, pp. 181-208; 2<sup>e</sup> partie, *ibid.*, pp. 237-248; 3<sup>e</sup> partie, *ibid.*, p. 261-268; 4<sup>e</sup> partie, *ibid.*, XXXI, pp. 129-151. — Notes sur l'Entomologie de la Haute-Marne in *Bull. Soc. Sc. nat. de la Haute-Marne*, I, n° 4 (mars-avril 1905), tirage à part, p. 1-18.

communs sur les coteaux arides : Rolampont, Prauthoy et probablement tout le plateau de Langres.

*Platynus livens* Gyll. — Eurville, bords de la Marne et forêt du Val, sous la vase desséchée d'un étang.

*Bembidion littorale* Ol. — Moeslains, au bord de la Blaise sur la vase; assez abondant.

*Brosicus cephalotes* L. — Rolampont, un individu. Déjà signalé de Channoy (ROYER).

*Haliphus varius* Nicol. (*maritimus* Fairm.). — Eurville, dans la Marne, en troublant l'eau dans un anse profonde et tranquille encombrée de plantes aquatiques, trois individus, septembre.

Aire de dispersion de cette espèce s'étend, par la Belgique et l'Allemagne du Nord, de la France septentrionale (Nord, Somme, Aisne, Oise) à la Finlande. Elle paraît d'ailleurs très rare partout.

*Haliphus confinis* Steph. — Deux individus, avec le précédent. Espèce septentrionale. Assez rare en France.

*Cnemidotus (Peltodytes) rotundatus* Aubé. — Très abondant, dans les mêmes conditions que les *Haliphus* signalés ci-dessus.

Espèce considérée comme méridionale; elle paraît atteindre dans le bassin de la Seine la limite septentrionale de son aire de dispersion. Je l'ai capturée d'autre part à Chaville (Seine-et-Oise) et à Pavillous-sous-Bois (Seine), ainsi qu'à St-Pierre-sur-Dives (Calvados). — Signalée aussi d'Alsace (LEPRIEUR).

*Hydroporus rufifrons* Duft. — Forêt du Val, lisière voisine de Valcourt, trois individus.

Espèce de l'Europe septentrionale et centrale; atteint dans le bassin de la Seine sa limite de dispersion méridionale. — J'en ai pris également un individu dans les mares de Belle-Croix, à Fontainebleau.

*Micropeplus staphylinoides* Marsh. — Commun à Chamouilley, dans une sablière sous bois, avec *M. porcatum* Payk. et l'espèce suivante.

*Micropeplus tesserula* Curtis. — Neuf individus avec les précédents. Très rare en France : signalé dans le bassin de la Seine d'après un individu unique capturé par M. J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE dans la forêt de Trois-Fontaines (Marne). Cité également de la Côte-d'Or.

Aire de répartition fort étendue : Europe (jusqu'à l'extrême Nord), Caucase, Sibérie; Nord de l'Afrique; Amérique du Nord; Bolivie (Faune Col. Bass. de la Seine, II, *Staphyloidea*, p. 9).

*Phloeonomus minimus* Er. — Eurville, août et septembre, une dizaine d'individus sous l'écorce recouvrant une plaie de chêne.

Espèce très rare dans le bassin de la Seine, signalée seulement des environs de Paris (Ch. BRISOUT) et de la forêt de Trois-Fontaines dans la Marne (J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE).

*Goryphium angusticolle* Steph. — Eurville, un individu au vol, septembre.

Répandu dans le bassin de la Seine, mais rare partout.

*Syntomium aeneum* Müll. — Chamouilley, en nombre dans une sablière sous bois, avec les *Micropeplus* signalés ci-dessus, dans la partie du talus à pic retenu par des racines.

Signalé seulement des environs de Paris (Marly, Marcil, Versailles), de Normandie (Eure, Seine-Inférieure, Calvados), de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne (Faune Col. Bass. de la Seine, II, *Staphylinoidea*, p. 56).

*Bledius procerulus* Er. — Chamouilley, très abondant sur un sentier de terre battue, où il se tenait profondément enterré.

Dans le bassin de la Seine, il est signalé seulement de la région de « Paris » (AUBÉ), de la forêt de Fontainebleau, de Dieppe et d'Amiens.

Contrairement aux indications de la Faune du bassin de la Seine (l. c., p. 87), les élytres, très fréquemment rouge brique, ont parfois une coloration brun foncé bien accusée.

*Bledius pallipes* Gravh. — Eurville, commun au bord de la Marne. Déjà signalé des bords de la Blaise, à Éclaron.

*Stenus asphaltinus* Er. — Eurville, un individu. — Presque partout dans le bassin de la Seine; n'était signalé ni de la Haute-Marne, ni de la Marne.

*Achenium humile* Nicolai. — Rolampont, avril 1897, dans les détritrus d'inondation de la Marne. — Non encore signalé de la Haute-Marne.

*Bisnius villosulus* Steph., *B. procerulus* Gravh. et *B. prolixus* Er. — Ces trois espèces ne sont pas rares à Eurville au bord de la Marne.

[*Philonthus nitidus* Er.] — C'est par erreur que cette espèce est indiquée comme capturée par moi à Rolampont (cf. J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, *Bull. Soc. Sc. nat. de la Haute-Marne*, sep. p. 7); je ne l'ai jamais prise dans le département de la Haute-Marne.

*Staphylinus fulvipes* Scop. — Rolampont, un individu.

*Staphylinus fossor* Scop. — Rolampont, un individu.

*Quedius fumatus* Steph. — Eurville, octobre, un individu.

*Quedius oblitteratus* Er. — Eurville, mai, un individu.

*Lamprinodes saginatus* Gravh. — Eurville, trois individus dans les détritits d'inondation de la Marne, en mars 1910.

*Encephalus complicans* Westw. — Chamouilley, un individu en tamisant des feuilles mortes, dans une sablière sous bois.

*Atheta (Megaloscapa) punctipennis* Kr. — Eurville, sept individus capturés le 21 mars 1913, dans les ornières pleines d'eau d'un chemin de culture, à proximité des dernières maisons du village.

Espèce très rare en France; mœurs inconnues.

*Zyras collaris* Payk. — Eurville, très abondant dans les détritits d'inondation de la Marne, en mars 1910.

*Lomechusa strumosa* Grav. — Rolampont, Eurville, Chevillon. Dans les colonies peu nombreuses de *Formica sanguinea* Latr., rarement isolé, souvent en sociétés de cinq à six individus.

*Atemeles paradoxus* Grav. et *A. emarginatus* Payk. — Rolampont, Eurville. Ça et là, sous les pierres recouvrant les nids de *Myrmica*; parfois au vol.

*Dinarda dentata* Gravh. — Rolampont, Chevillon, Eurville, Bienville, Chamouilley; commun, surtout dans les grandes colonies de *Formica sanguinea* Latr., sous les pierres.

*Ilyobates nigricollis* Payk. — Eurville, forêt du Val, un individu.

*Machaerites glabratus* Rye (*Abeillei* Guilleb.). — Forêt du Val, en septembre, un individu ♀ mégalophtalme, en tamisant du bois pourri.

Pour la synonymie et la répartition géographique de cette espèce, cf. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, in *L'Abeille*, XXXI, pp. 153-156 (1909). Depuis lors, l'espèce a été indiquée de Lagny (Seine-et-Marne) par A. HUSTACHE, in *Bull. Soc. ent. Fr.* [1915], p. 128.

*Chennium bituberculatum* Latr. et *Gentrotoma lucifuga* Heyd.<sup>(1)</sup>. — Rolampont, Chevillon, Bienville, Eurville.

Ces deux espèces vivent en compagnie du *Tetramorium caespitum* L., petite Fourmi qui nidifie sous les pierres, dans les friches à la lisière des bois. Elles ne sont pas très rares en mai et juin, puis

(1) Ces deux genres ont été retrouvés à Saclas (Seine-et-Oise) par M. L. BEDEL et moi.

en septembre et octobre, surtout par les matinées chaudes et orageuses et après une période de pluies.

*Gtenistes palpalis* Reichenb. — Eurville, Chamouilley, Bienville, août et septembre, sous les pierres enfoncées dans un sol argileux; assez rare et localisé (1).

*Claviger testaceus* Preysl. — Chamouilley, pentes rapides qui dominent la rive gauche de la Cousance, en amont de son confluent avec la Marne, sous les pierres recouvrant les nids de *Lasius flavus* F. et de *L. brunneus* Latr. Abondant en mai et juin, puis en septembre, mais extrêmement localisé.

*Choleva spadicea* Sturm. — Eurville, un individu.

*Colon latum* Kr. — Chamouilley, carrière de sable sous bois, un individu, en tamisant les débris végétaux à l'entrée d'un terrier abandonné (terrier de renard, probablement). — Espèce rare en France.

*Necrophorus germanicus* L. — Eurville, un individu. — Bien plus rare que le *N. humator* Goeze, qui abonde notamment dans la forêt du Val, où il vient aux appâts constitués par des *Limax* écrasés.

*Leptinus testaceus* Müll. — Lisière Est de la forêt du Val, deux individus en tamisant des feuilles sèches au pied d'un hêtre, avril 1909; bois de Bayard, à l'entrée d'un terrier de lapin de garenne, un individu, septembre 1910.

*Hetaerius ferrugineus* Ol. — Rolampont et Eurville, sous les pierres recouvrant les nids du *Formica sanguinea* Latr.; mai, juin.

*Dendrophilus punctatus* Herbst et *Amphotis marginata* F. — Eurville, dans un tronc d'arbre carié, habité par *Lasius fuliginosus* Latr.

*Podabrus alpinus* Payk. — Eurville, deux individus. Déjà cité de la forêt du Val et de Gudmont (J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, *Bull. Soc. Sc. nat. de la Haute-Marne*, sep. p. 10).

*Eucinetus haemorrhous* Duft. — Eurville, mars 1910, assez nombreux dans les débris d'inondation de la Marne.

*Helmis (Lareyniea) obscura* Müll. — Rolampont, ruisseau des Belles-Ondes, un individu.

(1) Très peu connu du bassin de la Seine et simplement indiqué par AUBÉ comme trouvé aux « environs de Paris » par J. CORDIER en 1843. M. L. BEDEL en a pris un individu sur la côte aride qui domine Saclas (Seine-et-Oise), en mai 1918.

*Esolus angustatus* Müll. — Rolampont, avec l'espèce précédente, assez abondant.

*Stenelmis canaliculata* Gyll. — Eurville, dans la Marne, sous les grosses pierres en dessous des barrages.

*Byrrhus glabratus* Heer (*ornatus* Panz.). — Rolampont, mars et avril 1897, deux individus. — Espèce commune dans les Vosges et le massif Central, non encore signalée du bassin de la Seine.

*Denticollis linearis* var. *suturalis* Duft. — Eurville, un individu. Le type de l'espèce n'est pas très rare.

*Poecilnota rutilans* F. — Chaumont, sur les vieux tilleuls des promenades de la ville, juin et juillet.

*Chrysobothris affinis* F. — Rolampont, dans un grenier contenant du bois provenant des environs.

*Meloe autumnalis* Oliv. — Eurville, assez commun à la fin de septembre.

*Metoecus paradoxus* L. — Forêt du Val, un individu.

*Orchesia undulata* Kr. — Forêt du Val, dans les branchages de hêtre ou de chêne couverts de moisissures. Espèce déjà signalée des environs immédiats d'Auberive (J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, *Bull. Soc. Sc. nat. de la Haute-Marne*, sep. p. 12).

*Orchesia fasciata* Payk. — Eurville, mars 1910, un individu dans les détritits d'inondation de la Marne. Déjà signalé de Gudmont (Id., *l. c.*, p. 11).

*Leptura (Anoplodera) rufipes* Schall. — Rolampont et forêt du Val, trois individus, juin-juillet. — Espèce rare dans le bassin de la Seine.

*Caenoptera minor* L. — Eurville, lisière des bois de sapins, en battant les aubépines. — Espèce acclimatée dans le bassin de la Seine, à la suite du développement des plantations d'Abiétinées.

*Callidium violaceum* L. — Eurville, plantations de pins et de sapins; espèce récemment acclimatée.

*Clytus (Xylotrechus) antilope* Zett. — Eurville, à la fin d'août : un individu éclos dans un grenier et provenant de bûches de chêne de la forêt du Val; nombreux débris dans les toiles d'araignée voisines.

Espèce déjà signalée de Gudmont et de Rolampont (J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, *l. c.*, p. 16).

*Anaglyptus mysticus* L. — Rolampont, juin 1895, six individus sur un tronc de chêne abattu.

*Cryptocephalus pini* L. — Chevillon, octobre, quatre individus en battant des buissons, à proximité de pins sylvestres. Espèce acclimatée de longue date dans le bassin de la Seine.

*Cryptocephalus chrysopus* Gmelin. — Rolampont, mai-juin.

*Cryptocephalus octopunctatus* Scop. — Rolampont, juin-juillet, sur les rejets de *Salix caprea*.

*Coptocephala unifasciata* Scop. — Rolampont, Eurville, assez commun.

*Coptocephala rubicunda* Laich. — Chaumont (CLERC), Eurville et Bienville, commun en août, en fauchant sur une Ombellifère à fleurs jaunes.

Espèce distincte de la précédente et déjà signalée de la Haute-Marne : Chassigny (CLERC), localité qui fait partie du bassin de la Saône.

*Pachnophorus pilosus* Rossi. — Eurville, abondant en septembre dans une carrière d'argile, au pied des talus à pic.

*Chrysomela limbata* F. — Rolampont, août-septembre; assez commun sous les pierres ou courant sur le sol.

*Chrysomela caerulans* Scriba. — Rolampont, Eurville, sur divers *Mentha*, au bord de la Marne, très abondant.

*Melasoma (Lina) haemorrhoidale* L. et var. *aeneum* L. — Eurville, forêt du Val; le type et la variété assez communs sur l'*Alnus glutinosa*.

*Melasoma vigintipunctatum* Scop. — Rolampont, un individu au bord du canal; Eurville, avril 1906, un individu en fauchant des *Salix*, au bord de la Marne.

L'individu capturé à Rolampont a été déjà signalé (J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, *Bull. Soc. Sc. nat. de la Haute-Marne*, sep. p. 17) et l'espèce a été d'autre part prise une fois par M. Ch. DEMAISON près d'Épernay (Marne). Ces diverses captures semblent accidentelles; elles portent toutes sur des exemplaires isolés, alors que l'espèce, là où elle est indigène (Vosges, Jura, Savoie), vit toujours en colonies assez nombreuses, comme presque toutes les espèces du genre.

*Epithrix atropae* Foudr. — Forêt du Val, commun sur la Belladone.

*Thyamis obliterata* Rosenh. — Eurville, commun sur *Salvia pratensis*.

*Dibolia femoralis* Redt. — Bienville, août, abondant sur *Salvia*

*pratensis*, le long d'un talus du chemin allant à Laneuville-à-Bayard, mais très localisé sur une étendue d'une centaine de mètres.

Signalé seulement de la forêt de Saint-Germain (Seine-et-Oise) et des environs de Dijon (cf. BEDEL, Faune Col. Bass. de la Seine, V, p. 330).

*Dibolia timida* Illig. — Bienville, Eurville, abondant sur l'*Eryngium campestre*.

*Dibolia cryptocephala* Koch. — Avec l'espèce précédente, plus rare.

*Dibolia Færsteri* Bach. — Forêt du Val, pas très rare sur les pieds rabougris de *Betonica officinalis*, dans les premiers jours d'août (1).

Espèce septentrionale : provinces Rhénanes, Thuringe, Silésie, Alpes, Hongrie, Transylvanie et Balkans (cf. BEDEL, l. c., p. 321).

*Apteropeda globosa* Illig. — Forêt du Val, en fauchant, trois individus.

Espèce rare : îles Britanniques, Europe moyenne.

*Cimberis attelaboides* F. — Bienville, Bayard, en battant les pins sylvestres, mai-juin.

*Doedycorrhynchus austriacus* Ol. — Avec l'espèce précédente, assez abondant.

*Anthonomus varians* Payk. — Bienville, Bayard, sur les pins sylvestres; assez commun par places. Comme dans tout le bassin de la Seine, les exemplaires recueillis sont d'un roux uniforme, sauf sur la tête qui est toujours noire, le rostre seul tantôt noir, tantôt roux. Cette espèce n'était pas connue du bassin de la Seine en 1888, date où a été terminé le tome VI de la Faune publiée par L. BEDEL; elle s'est largement propagée depuis et est actuellement très répandue dans les plantations de pins, même aux environs de Paris.

*Baris artemisiae* Herbst. — Eurville, mai 1909, un individu. Cette espèce qui n'était guère connue du bassin de la Seine jusqu'en 1888 (cf. L. BEDEL, l. c., p. 348) a été retrouvée depuis dans la Seine, en Seine-et-Oise, dans l'Oise et dans l'Aisne.

Sa capture à Eurville confirme celle faite à St-Dizier, par J. SAINTE-

(1) Abondant, avant la fenaison, sur les *Betonica* dans les allées herbeuses des grands bois de l'Orne [bois de Chérencei!] et d'Eure-et-Loir [forêt de Senonches!]. — L'éclosion a lieu dès les premières pluies du mois d'août. — L. BEDEL.

CLAIRE DEVILLE, de larves vivant au collet des pieds d'*Artemisia vulgaris*, et qu'il attribue à ce même Curculionide (*Bull. Soc. Sc. nat. de la Haute-Marne*, sep. p. 14).

*Otiorrhynchus lutosus* Stierl. — Coteaux secs et friches près de Bienville. Espèce déjà signalée de Gudmont et d'Auberive.

*Cleonus (Pseudocleonus) grammicus* Panz. — Eurville, trois individus. Paraît rare dans le bassin de la Seine et cantonné dans sa région orientale (Aube, Yonne, Côte-d'Or).

*Lixus algirus* L. — Eurville, mai-juin. Rare et localisé.

*Lixus myagri* Ol. — Rolampont, un individu.

*Hypera intermedia* Germ. — Eurville, dans les détritits d'inondation de la Marne, mars 1910.

*Rhynchaenus (Pseudorchestes) persimilis* Reitt. 1911 (*cinereus* † Bed., olim). — Côtes de Bayard, en fauchant sur des friches; août-septembre (1).

Seine-et-Oise (Bouray, Saclas, etc.), Yonne, Aube.

*Magdalis rufa* Germ. — Chevillon, en battant des pins sylvestres : assez commun en septembre.

*Magdalis violacea* L. — Chevillon, côte de Bayard, Chamouilley, Joinville; en battant les pins.

*Magdalis nitida* Gyll. — Eurville, mai 1909, un individu.

Déjà signalé de la Marne, sur *Picea excelsa* (J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, *Bull. Soc. Sc. nat. de la Haute-Marne*, sep. p. 15).

*Magdalis phlegmatica* Herbst. — Eurville, un individu en battant des bouleaux, mai 1913.

D'autre part, j'en possède un exemplaire provenant de Sèvres (Seine-et-Oise), et M. L. BEDEL capture régulièrement cette espèce à Saclas (Seine-et-Oise) où elle est devenue très abondante dans les plantations de *Pinus silvestris*.

N'était pas signalé du bassin de la Seine à la date de 1888 où a paru le tome VI de la « Faune du Bassin de la Seine ».

*Liparus (Molytes) germanus* L. — Rolampont, un individu. — Espèce peu commune dans le bassin de la Seine, mais connue actuellement de l'Oise, de l'Aisne et de la Seine-Inférieure, ainsi que de la

(1) Sur la côte de Saclas (Seine-et-Oise), cette espèce vit sur les feuilles de *Centaurea scabiosa*. — L. BEDEL.

Somme et du Pas-de-Calais; plus fréquente, par contre, dans les Vosges, les Ardennes, le massif Central, etc.

*Pentarthrum Huttoni* Woll. — Rolampont, en nombre dans de vieilles planches, où il se développait.

J'ai repris cette espèce dans les mêmes conditions à Paris, dans ma cave, où elle se reproduit depuis plusieurs années dans une bûche actuellement presque réduite en poussière (1).

*Platypus cylindrus* Herbst. — Forêt du Val, dans le bois d'un vieux chêne, octobre 1908.

*Aphodius quadrimaculatus* L. — Rolampont, août 1903, dans les crottes de mouton. Déjà signalé de Gudmont (J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE).

*Aphodius satellitius* Herbst. — Eurville, très abondant en mai 1916. Non encore noté du département de la Haute-Marne.

*Odontaeus armiger* Scop. — Eurville, un individu au vol.

(1) Cf. A. HONORÉ, *Bull. Soc. ent. Fr.* [1918], p. 126.

